

ノロウイルス食中毒注意報を発令しました！

例年、冬季には感染性胃腸炎が流行し、ノロウイルス食中毒が多発する状況があります。

名古屋市ではノロウイルスによる食中毒の発生が予想される場合に、「ノロウイルス食中毒注意報・警報」を発令し、注意を呼び掛けています。本日「ノロウイルス食中毒注意報」を発令しましたので、食品の取り扱いには十分注意し、食中毒防止に努めてください。

発令期間

平成 28 年 1 月 2 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

※食中毒の発生状況に応じて期間中に「警報」を発令することがあります。「警報」は発令時より 1 週間効力を有し、その後は自動的に解除され、注意報へ切り替わります。

ノロウイルスの特徴

- 人の小腸でのみ増殖し、胃腸風邪のような症状（下痢、嘔吐等）を起こします。
（症状は、一般に数日で回復します。）
- 少ないウイルス量（100 個以下）でも感染します。
症状がなくなっても、しばらくの間、便とともにウイルスが排泄され、食品を汚染したり感染を広げたりする場合があります。
- 感染しても症状のない人もいますが、便にはウイルスが排泄されます。

ノロウイルス食中毒の予防方法

① 手洗いはしっかり

調理前、食事前、トイレの後、オムツ交換後、吐物の処理後は、特に**念入りに手を洗いましょう**。
使い捨て手袋の使用も有効です。

② 食品は中心部まで十分加熱

中心温度 85～90℃で 90 秒間以上加熱しましょう。
加熱調理後も、再汚染のないよう取扱いに注意！

③ 調理器具などを洗浄・消毒

まな板、包丁、食器、ふきん等は、十分に洗浄した後、**熱湯（85～90℃で 90 秒間以上）**又は、**次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度約 200ppm）※**で消毒しましょう。
※水 2 リットルに対して市販の台所用漂白剤を 10 ミリリットル加えます。

④ 調理する人の体調に注意


下痢や嘔吐などの症状がある場合は、ノロウイルスに感染している可能性がありますので、調理は控えましょう。

症状がなくても感染している場合があります。日頃から手洗いをしっかり行い、使い捨て手袋を使用するなどして、食品の汚染や他人への感染を防ぎましょう。

⑤ 患者の吐物は適切に処理

患者の吐物や便には**感染力のあるウイルスが残っている可能性があるため、調理器具などよりも高濃度の次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度約 1000ppm）※**を使用してウイルスが飛び散らないように速やかに処理をしましょう。

※水 2 リットルに対して市販の台所用漂白剤を 50 ミリリットル加えます。




名古屋市における食中毒発生状況

名古屋市で発生した平成 23 年から平成 27 年の 5 年間の食中毒のうち、**ノロウイルスによる食中毒の発生件数が最も多く、患者数は食中毒全体の 57%**と非常に高い割合を占めています。


	発生件数	うちノロウイルス 食中毒	患者数	うちノロウイルス 食中毒
平成 23 年	14	5	281	144
平成 24 年	17	7	633	284
平成 25 年	8	3	120	63
平成 26 年	16	8	398	283
平成 27 年	9	7	136	115
合計	64	30	1,568	889

H23～27年 食中毒事件数
(名古屋市)



ノロウイルスによる件数が**第1位**

H23～27年 食中毒患者数
(名古屋市)



ノロウイルスによるものが**57%**

H23年～H27年 月別ノロウイルス食中毒 事件数・患者数 (名古屋市)

